



TI JE HERO I RRALLE! !

ZBULONI SHENJAT E HERSHME
TË ATROFISË MUSKULARE
SPINALE (SMA)¹⁻³



Vizitojeni ueb faqen e shoqatës jetë me sfida për
të marrë më shumë informacione dhe për t'u
lidhur me familje të tjera:

challenges.mk

Kur flasim për SMA-në kemi të bëjmë me një garë me kohën, ku diagnostikimi i shpejtë është thelbë-sor sepse dëmtimi që shkaktohet përpala mjekimit është i pakthyeshëm.^{4,5} Kontrolloni shenjat në vi-jim në vizitat e rregullta apo nëse prindërit ose ku-jdestarët shprehin çfarëdo shqetësimi.^{3,6}

Si punonjës shëndetësor keni rastin unik të zbuloni nëse fëmija është duke u zhvilluar siç duhet.⁶ Kontrollojini shenjat e mëposhtme në kontrollet e rregullta ose nëse prindërit apo kujdestarët shprehin çfarëdo shqetësimi.^{3,6}

SHENJAT E SMA-së: MOSHA 0–6 MUAJ

Shenjat tejet të hershme të SMA-së zakonisht mund të zbulohen në 6 muajt e parë të jetës,^{1,2} shpesh në moshën 3 mujore.²⁷ Edhe pse fëmijët mund të janë simptomatikë, ata do të kenë reagime kognitive dhe vëmendje normale; aftësitet e tyre kognitive nuk do të preken.¹

HIPOTONIA^{1,7}

- Fëmija me hipotonitë përskruhet shpesh si i "brishtë"⁸ për shkak të dobësisë në duar dhe në këmbë.^{1,7}
- Dobësia simetrike që është më tepër proksimale sesa distale¹ do të thotë se fëmija do të ketë vështirësi me ngritjen e duarve dhe këmbëve, por do t'i raujë funksionet e duarve dhe gjithëritëne⁸.
- Këmbët e fémijës mund të duken më të dobëta se duart¹.
- Në rastet e rënda, fëmija mund të ketë pozitën e bretkosës së shtrire^{1,9}.

AREFLEKSIJA²

- Karakteristike është mungesa apo reduktimi i refleksave të tretave të thellë^{1,2} dhe kjo është pjesë e rëndësishme e kontrollit të fémijës në rastet e hipotonisë².
- Vlerësimi i refleksave të tretave të thella mund të arrinë përmes vëzhgimit të kujdeshëm të reagimit të fémijëve ndaj goditjeve të shpejtja në tretiva me çekanin e posaçem¹⁰.

PËRKULJA E KOKËS MBRAPA¹¹

- Nëse fëmija duket se nuk mund të ngrejë kokën ose ka lëvizshmëri të dobët të kokës,^{1,12} mund të zbatohet testi i tërheqjes së fémijës për duarsh në pozicionin ulur, që të vërtetohet njëjja e kokës mbrapa¹².
- Të një fémijë që nuk zhvillhon sic duhet, me gjasë do të vërehet njëja e kokës mbrapa trupit me qafën plotështë të zgjatur gjatë tërheqjes për në pozicionin ulur^{1,11–12}.
- Ndoshës fëmija nuk mund ta ngrejë dot kokën mbi nivelin e shpinës kur ta mbani atë horizontalisht me fytyrë poshtë¹².

FRYMËMARRJA E VËSHTIRËSUAR^{7,8}

- Dobësia e muskujve ndërmet brinjëve dhe me diafragmën të dobësuar mund t'i jape fémijës formë kambanore të gjokstës dhe një frysëmarrje paradoksale, që shpesh herë quhet edhe "frysëmarrje nga barku".⁸

GËLLITITJA E VËSHTIRËSUAR^{1,3}

- Vështirësiti me thithjen, të ushqyerit, apo me sekretimin nga goja (pështyma) mund të tregojnë për dobësinë e gjuhës dhe gjëltitjes të cilat janë tipike për SMA-në.^{1,3,11}
- Në rastet më të vështira mund të paraqiten rastet e ngullafjas, aspirimeve të përsëritura apo ngecja në rrjete.^{1,11}

FASCIKULACIONET E GJUHËS^{1,3}

- Shpesh fëmija me SMA ka fascikulacione të gjuhës apo dridhje të gjuhës bashkë me atrofi.^{1,3}

E QARA DHE KOLLIT E DOBËT³

- Fëmija me SMA mund të ketë qarje të dobët.^{1,8}
- Dobësia e muskujve respiratorë mund të shkaktojë gjithashtu vështirësi serioze me kolitjen.⁸



KONTAKTONI MENJËHERË NEUROLOGUN
PEDIATRË NËSE VËRENI KËTO SHENJA^{4,14}

SHENJAT E SMA-së: MOSHA 6–18 MUAJ

Shenjat e hershme të SMA-së zakonisht mund të vërehen deri në moshën 18 muajsh,¹ shpesh në moshën 10 muajsh.⁷ Edhe pse fëmijët mund të janë simptomatikë, ata do të kenë reagim normal kongnitiv dhe zhvillim normal të të folur.¹⁵

HIPOTONIA¹

- Tonusi dhe fuqia e dobësuar e muskujve gjatë ekzaminimit, bashkë me të dhëna për tonus muskular të dobët që në muajt e parë të jetës janëshenjat kryesore të SMA-së.²
- Mund të jetë e pranishme edhe një dobësi në këmbë duar në duar.
- Fëmija mund të ketë vështirësi në kapjen dhe ngritjen e sendeve¹⁶.
- Fëmija nuk mund që gëndrojë në këmbë për shkak të dobësisë së shpërhequr të tyre dhe ka gjasa të vogla se do të mund të ecë në vëtem.^{1,3}

AREFLEKSIJA²

- Karakteristike në SMA-së është mungesa apo reduktimi i refleksave të tretave të thellë^{1,2} dhe kjo është pjesë e rëndësishme e kontrollit të fémijës në rastet e hipotonisë.²
- Vlerësimi i refleksave të tretave të thella mund të arrin përmes vëzhgimit të kujdeshëm të reagimit të fémijëve ndaj goditjeve të shpejtja në tretiva me çekanin e posaçem.¹⁰

DRIDHJA E LEHTË³

- Kur fëmija shtrin gjishtat ose tenton të kapë një send me duar mund të vëreni një dridhje të lehtë.^{1,17}
- Gjithashtu mund të shfaqet edhe një dridhje e muskujve të supit.¹⁷

SKOLIOZA PROGRESIVE DHE KONTRAKSIONET E GJYMTYRËVE^{1–3,18}

- Fëmija mund të ketë kufizime më serioze të lëvizjeve në ekstremitetet e poshtme se në ato të sipërme.¹⁹
- Mund të vërehet skoliozë progressive, më shpeshtë në formën e shkrnjës C, kontraktura kryesish të gjunjave dhe të kyçit të këmbës, si dhe ngurtësim i legenit.^{1–3,18,19}

SIMPTOMAT RESPIRATORË²

- Sémundja restrikitive e mushkërive mund të jetë pasojë e dobësimit progresiv të muskujve ndërmet brinjëve vegancërisht nëse fëmija ka edhe skolozën.¹
- Shenjat e sémundjes restrikтиве të mushkërive përfshijnë zvogëlimin e kapacitetit të përgjithshëm të mushkërive, më vilimini normal ekspiratori.²⁰

ETAPAT E VONUARA/TË MUNGUARA NË ZHVILLIMIN MOTORIK^{2,3}

- Edhe pse fëmija mund t'i kete arritur etapat e zhvillimit, ato me gjasë janëkarur me vonezë.²
- Pas një kohe të caktuar vërehet perkëqësimi gradual i funksioneve motorike, dhe disa faza zhvillimore, si ulja pa mbishetje ose qendrimi në këmbë nuk do të mund të arrinë²¹.