



ТИ СИ РЕДОК ХЕРОЈ!

ОТКРИЈТЕ ГИ РАНИТЕ ЗНАЦИ НА
СПИНАЛНА МУСКУЛНА
АТРОФИЈА (СМА)¹⁻³



Посетете ја веб страната на здружението
ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ за да добиете
повеќе информации и да се поврзете
со други семејства:

challenges.mk

Кога се работи за СМА, тоа е трка со времето, каде раното
дијагностицирање е од суштинско значење, бидејќи штетата
која настанува е неповратна.^{4,5}

Проверете ги следните знаци при редовните прегледи кај
лекарот или, пак, ако родителите или старателите имаат
било каква загриженост. Како здравствен работник, имате
должност да проверите дали детето се развива правилно.

СИМПТОМИ НА СМА: ВОЗРАСТ 0-6 МЕСЕЦИ

Раните знаци на СМА обично можат да се откријат во првите 6 месеци од животот,^{1,2} често на возраст од 3 месеци.^{2,7} Иако децата можат да имаат симптоми, тие ќе имаат нормални когнитивни реакции и внимание; нивните когнитивни способности нема да бидат погодени.¹

ХИПОТОНИЈА^{1,7}

- Децата со хипотонија често се опишуваат како „кревки“⁸ поради слабост во рацете и нозете.^{1,7}
- Симетричната слабост која повеќе е проектирана отколку дигитална,⁹ значи дека детето ќе има потешкотии да ги крева рацете и нозете, но ќе ја задржи функцијата на рацете и прстите⁸.
- Нозете на детето можат да изгледаат послаби отколку рацете⁸.
- По потешкотии случај, детето може да има положба на лежечка жаба^{1,9}.

АРЕФЛЕКСИЈА²

- Карakterистично за СМА е отсуството или намалувањето на рефлексите на длабоките тетиви^{1,2} а тоа е важен дел од прегледот на детето во случај на хипотонија¹⁰.
- Проценката на длабоките тетивни рефлекси може да се постигне преку внимателно набљудување на реакцијата на децата преку брзи удари на тетивите со специјално чекање¹⁰.

НАВАЛУВАЊЕ НА ГЛАВАТА НАЗАД¹¹

- Ако детето изгледа дека не може да ја подигне главата или има слаба поддржност на истата,^{11,12} може да се примени тест за подизање на детето држите го со рацете во седеачка положка, за да се потврди навалувањето на главата назад.¹²
- Каде детето не се развија правилно, сигурно ќе се појави навалување на главата напред, со целосно издолжен врат.^{11,13}
- Можеби тие не можат да ја кренат главата над нивото на гробот кога ги држите хоризонтално со лицето надолу⁸.

ОТЕЖНАТО ДИШЕЊЕ^{7,8}

- Слабоста на мускулите помеѓу ребрата и ослабената диафрагма може да му даде на детето звончест облик на градите и пародоксално дишење, кое честопати се нарекува „стомачно дишење“¹.

ОТЕЖНАТО ГОЛТАЊЕ^{4,9}

- Потешкотите со цицањето, хранењето или голтањето можат да укажуваат на слабост на јазикот и голтањето, кои се типични за СМА.^{1,3,11}
- По потешкотии случај, можат да се појават случаи на тушчење, повторна аспирација или бавен и намален раст.^{1,8,11}

ЈАЗИЧНИ ФАСЦИКУЛАЦИИ^{1,3}

- Детето со СМА често ќе има фасцикулации или треперение на јазикот заедно со атрофија.^{1,3}

СЛАБ ПЛАЧ И КАШЛАНЬЕ³

- Детето со СМА може да има слаб плач^{1,8}.
- Слабоста на респираторните мускули, исто така, може да предизвика сериозни потешкотии при кашлање⁸.



ВЕДНАШ КОНТАКТИРАЈТЕ ПЕДИЈАТАР
ДОКОЛКУ ГИ ЗАБЕЛЕЖИТЕ ОВИЕ ЗНАЦИ^{14,4}

СИМПТОМИ НА СМА: ВОЗРАСТ 6-18 МЕСЕЦИ

Раните симптоми на СМА обично можат да се откријат до 18 месечна возраст¹, често во 10-тиот месец.⁷ Иако децата можат да имаат симптоми, тие ќе имаат нормални когнитивни реакции и нормален говорен развој.¹⁸

ХИПОТОНИЈА¹

- Намален тонус и мускулна сила за време на прегледот, можби со историја на slab мускулен тонус во првите месеци од животот, се главните знаци на СМА.³
- Може да се појави и слабост во и рацете и нозете¹.
- Детето може да има потешкотии при факање и кревање предмети¹⁶.
- Детето не може да стое поради неговата изразена слабост и веројатно нема да може да оди самостојно.^{1,3}

АРЕФЛЕКСИЈА²

- Карakterистично за СМА е отсуството или намалувањето на длабоките тетивни рефлекси^{1,2} и ова е важен дел од прегледот на детето во случај на хипотонија¹⁰.
- Проценката на длабоките тетивни рефлекси може да се постигне преку внимателно набљудување на реакцијата на децата со брзи удари на тетивите со специјално чекање¹⁰.

БЛАГО ТРЕПЕРЕНЬЕ НА РАЦЕТЕ³

- Кога детето ги истегнува прстите или се обидува да фати предмет со рацете, може да забележите благо треперение.^{1,11}
- Може да се појави и треперение на мускулите на рамото.¹¹

ПРОГРЕСИВНА СКОЛИОЗА И КОНТРАКТУРИ НА ЕКСТРЕМИТЕТИТЕ^{1,3,18}

- Детето може да има посеризиозни ограничувања во движењето на долните отколку на горните екстремитети.¹⁹
- Може да се утврди прогресивна сколиоза, најчесто во форма на буквата S, контрактури главно на колената и на глужбовите, како и влошениотост на карпицата^{1,3,18}.

РЕСПИРАТОРНИ СИМПТОМИ²

- Рестриктивното белодробно заболување може да биде резултат на прогресивно слабеење на меѓубрениите мускули² особено ако детето има и сколиоза³.
- Знаци на рестриктивната белодробна болест вклучуваат намален вкупен капацитет, како и намален витален капацитет со зачуван волумен на издишуваче²⁰.

ЗАДОЦНЕТИ/ОТСУТНИ ДОСТИГНУВАЊА ВО МОТОРНИОТ РАЗВОЈ^{2,3}

- Иако детето можеби ги постигнало фазите на својот развој, тие најверојатно биле задоцнети².
- По одредено време, се забележува постепено влошување на моторните функции, ја отсуствува седнувањето и станувањето или стоињето без помош².